

femidoc® UROEXPRESS® TASAKOK

Az E. coli által okozott visszatérő húgyúti fertőzések/ hólyaggyulladások megelőzésére szolgál. Támogatja a húgyúti fertőzések kezelését.

Javaslat: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, mielőtt alkalmazni kezdi a femidoc® UROEXPRESS®-t, még akkor is, ha korábban már használta ezt az orvostechikai eszközt. Az információ módosulhatott az új kutatások és adatok alapján az utolsó csomag felbontása óta eltelt időben. Tartsa meg a használati útmutatót, a későbbiekben még szüksége lehet rá.

Alkalmazás: A femidoc® UROEXPRESS® az E. coli által okozott húgyúti fertőzések kezelésének támogatására, valamint a visszatérő húgyúti fertőzések (hólyaggyulladás) elleni védelemre szolgál.

A hólyaggyulladás tünetei a következők:

- Égő vagy fájdalmas érzés vizelés közben
- Vizeleti inger
- A húgyhólyag gyakori ürítése
- Hasi fájdalom.

Kérjük, keresse fel gyógyszerészét vagy kezelőorvosát, ha hólyaggyulladás tüneteit észleli.

Adagolás és alkalmazás felnőtteknek 18 éves kortól:

Megelőzés céljából naponta egyszer 1 tasak tartalmát kell bevenni. A kezelés támogatására naponta kétszer 1 tasak tartalmát kell bevenni. Öntse a tasak tartalmát egy vízzel (200 ml) teli pohárba, és keverje össze. Azonnal fogyassza el. Szájon át történő alkalmazásra. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot.

Az alkalmazás időtartama: A femidoc® UROEXPRESS® egy kezelési perióduson belül legfeljebb 30 napon át használható. A kezelés 4 napos szünet után folytatható.

Hogyan működik?

Hatóanyaga a D-mannóz. A D-mannóz természetesen előfordul az emberi anyagcserében. A D-mannóz az E. coli baktériumokhoz tapad, ezzel megakadályozza, hogy a baktériumok megtelepedjenek a húgyutak falán. Így a baktériumok egyszerűen kiürülnek a szervezetből vizelés közben.

Mellékhatások: A femidoc® UROEXPRESS® jól tolerálható és kevés mellékhatása van. Az egyik lehetséges mellékhatás a hasmenés; ez azonban ritkán fordul elő.

Alkalmazás terhesség és / vagy szoptatás idején:

Nem állnak rendelkezésre adatok a femidoc® UROEXPRESS® terhesség vagy szoptatás alatti alkalmazására vonatkozóan. Mielőtt ezt a terméket terhesség alatt, ill. szoptatás idején alkalmazná, kérjük, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Figyelmeztetések:

- Ne használja a terméket, ha bármely alábbi összetevőre allergiás.
- Túladagolás esetén olyan tünetek jelentkezhetnek, mint puffadás, hasi fájdalom és hasmenés.
- Kisgyermekek elől elzárva tartandó.
- Ha bármilyen nem kívánt reakciót észlel, hagyja abba a femidoc® UROEXPRESS® szedését.

Kérjük, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészához, ha:

- Vérnyomokat észlel a vizeletben.
- A tünetek továbbra is fennállnak, és 7 nap után esetleg még súlyosbodnak.
- Valami más betegségben szenved vagy egyéb gyógyszereket szed.
- Húgyhólyag-fertőzésre vagy felső húgyúti fertőzésre utaló tünetei vannak, mint például 38°C-os vagy magasabb láz, csillapíthatatlan láz/hidegrázás, rosszullet (hányinger), hányás vagy hasmenés. Lehet, hogy felső húgyúti fertőzése van, ami speciális kezelést igényel.
- Önnek a múltban már volt vesekőve.
- Vérhígítót szed.

Összetétel: D-mannóz, dextróz, szorbit, inulin, trikálcium-foszfát, erdei gyümölcs aroma, magnézium-sztearát, sztyívia.

A tasak tartalma: 2 g D-mannóz.

Tartalom: 14 tasak.

Tárolás: Szobahőmérsékleten (5-25 °C), száraz, sötét helyen, az eredeti csomagolásban tartandó. Kisgyermekek elől elzárva tartandó.

Lejárati idő: Semmiképpen nem javasoljuk a femidoc® UROEXPRESS® alkalmazását a csomagoláson feltüntetett dátum után.

A femidoc® UROEXPRESS® az MDD 2007/47/EK európai uniós módosítási irányelvvel módosított 93/42/EGK irányelv meghatározása szerint IIa. osztályú **orvostechikai eszköz**.

A használati útmutató legutóbbi felülvizsgálatának időpontja: 2021. 07. v. 1.1 073996-V1.1

Magyarországon forgalmazza:

Hello Pharma Kft., 2131 Gőd, Vasvári Pál utca 38/A. info@hellopharma.hu

doc phytolabor
guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG,
Eduard-Bodem-Gasse 6, A-6020 Innsbruck, Ausztria
doc@guterrat.net

PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, Hollandia